

Директор ОП ООО «Варикоза нет»
Г.Альметьевск, ул. Денина 1А
г.Казань, ул. Достоевского 40



Возможные риски и осложнения, сопутствующие вмешательству (комбинированному лечению варикозной болезни, включая эндовенозную лазерную коагуляцию), которые могут развиться вовремя или сразу после медицинского вмешательства, в том числе:

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;

- Некроз кожи и подкожно-жировой клетчатки;
- Воспаление подкожных вен, лимфорея и лимфоплея;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематом;
- Повреждение нервов, ожоги кожи, повышении температуры до 38° до 7 дней;
- Возникновение артериовенозных фистул;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Терминдуцированный тромбоз;
- Аллергические реакции на вводимые препараты и/или местные анестетики;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности
- Развитие венозного тромбоза, летального исхода.
- жжение — зуд кожи, в области манипуляций;
- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- дыхательные нарушения: затруднение вдоха, тяжесть за грудиной, кашель, чуж-
- неврологические нарушения: мигреноподобные боли, нарушения зрения, речи;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение ко-
- в редких случаях через 2-4 недели после лечения по ходу склерозированной ко-
- течение 4-6 месяцев.